

NOTE COMPLÉMENTAIRE SUR LE BŒUF SAUVAGE DU CAMBODGE  
(*BOS (BIBOS) SAUVELI* URBAIN).

PAR Ach. URBAIN.

Au cours de trois notes parues depuis 1937 <sup>1</sup>, nous avons présenté une nouvelle forme de bovidé asiatique : le Kou-Prey ou Bœuf gris cambodgien. Cet animal que nous avons rapporté jeune du Cambodge est maintenant adulte et nous tenons à préciser ses caractères en le désignant comme type (Holotype) de l'espèce



Le Kou-Prey du Parc Zoologique du Bois de Vincennes.  
(Cliché G. Broihanne).

nouvelle à laquelle nous avons déjà proposé de donner le nom de *Bos (Bibos) sauveli* <sup>2</sup>.

*Holotype*. — Capturé jeune aux environs de Tchep, Nord Cambodge, en juillet 1936, ♂ adulte (4 ans en décembre 1939). Vivant au Parc Zoologique du Bois de Vincennes (Paris).

1. Ach. URBAIN : Le Kou-Prey ou bœuf gris cambodgien. *Bull. Soc. Zool. de France*, 1937, pp. 305-307.

Ach. URBAIN : Le Kou-Prey ou bœuf sauvage cambodgien. *Mammalia*, 1937, pp. 256-258.

Ach. URBAIN, P. RODE et M.-A. PASQUIER : La collection des Bovinés asiatiques du Parc Zoologique du Bois de Vincennes. *Mammalia*, 1939, pp. 122-125.

2. Dédié à M. le Dr. Vétérinaire Sauvel.

*Caractères.* — Dimensions : Hauteur au garrot : 1 m. 57 (Certains sujets peuvent atteindre 1 m. 90).

Ce bovidé diffère du Banting et du Gaur. Il est plus élancé que le Gaur et possède un fanon très développé qui n'existe pas chez le Banting. D'une façon générale, d'ailleurs, ses formes sont moins lourdes et plus gracieuses que celles des autres bovidés asiatiques.

Le pelage est gris très foncé, presque noir. Il devient noir mat chez les vieux taureaux avec des neigures aux épaules et sur la croupe. Le poil est court et fin, donnant un aspect velouté à la robe.

Les cornes cylindriques sont claires à la base, noires à l'extrémité. Elles sont largement écartées et se recourbent vers l'avant. Des stries délimitant des parties superficielles de corne sont visibles près de la pointe. Ces écaillures, ainsi que nous avons pu le constater chez de vieux mâles, peuvent former des rosaces de filaments cornés. Le front est dépourvu de dépression, le chignon est étroit, couvert d'un poil ras, velouté. Le garrot est puissant, sans déformation musculaire, prolongé en arrière sur la région dorsale.

Les oreilles sont fines et fuselées. Les yeux sont marrons. Les extrémités des membres sont blanches, mais le devant des membres antérieurs est noir par place, ainsi que la partie située au-dessus des sabots, aux membres postérieurs. Ces extrémités sont très fines. Le fanon est très développé. La queue est longue, tombant presque jusqu'aux talons.

Répartition géographique : Cambodge. Le Kou-Prey est très rare et vit dans les forêts clairières.